



SAMMAKOT

Ruskosammakko *Rana temporaria*

Viitasammakko *Rana arvalis*

Rupikonna *Bufo bufo*



Kaikki yleiset sammakolajimme eli tavallinen sammakko (ruskosammakko), viitasammakko ja rupikonna aloittavat kutemisen pian jäiden lähdettyä. Munarypäs painuu aluksi järven tai lammen pohjaan. Kun munia ympäröivä hyytelö imee vettä, kutu nousee lämpimään pintaveeteen. Sammakon kutua voi katsoa, mutta se pitää jättää rauhaan. Parissa viikossa munista kehittyy nuijapäitä, jotka kesän aikana kasvavat aikuisiksi sammakoiksi.

Keväisinä aamuina ja illan hämärässä on hyvä aika kuunnella sammakon kurnutusta, viitasammakon pulputusta ja rupikonnann urputusta. Sammakolajit on helppo erottaa toisistaan äänten perusteella.



Merkitkää kartalle, missä havaitsette sammakoita tai sammakon kutua. Laittakaa ylös myös päivämäärät.



Millaisessa ympäristössä havaitsemanne sammakot ovat? Millainen vesistöympäristö alueella on?



**Tehkää retki alueelle, jolla on sammakoita. Havainnoikaa sammakoiden elinympäristöä ja tunnista-
kaa alueen kasvillisuutta. Voitte myös piirtää
tai maalata sammakoita ja niiden elinympäristöjä.**

